LA COCAÏNE ET SES MULTIPLES FACETTES

**COCAÏNE, SANTÉ MENTALE ET PRISE DE RISQUE : PORTRAIT DE
SITUATION ET PISTES POUR L'INTERVENTION**

Formation croisée à partir des résultats du projet COSMO

9 Avril 2014

**Didier Jutras-Aswad MD, MSc, FRCPC
Professeur adjoint de clinique, Université de Montréal
Directeur, Unité de Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM
Chercheur, CRCHUM**

Objectifs

1. **Connaître les principales données épidémiologiques sur la consommation de cocaïne**
2. **Connaître les principaux modes de consommation de la cocaïne**
3. **Comprendre les principaux effets de la cocaïne, tant du point de vue neurobiologique que clinique**
4. **Se familiariser avec les notions de « craving » et de « binge »**

Épidémiologie

Map 5. Prevalence of cocaine use in 2010 (or latest year)

Épidémiologie

Fig. 47. Distribution of cocaine users (annual prevalence), figures for 2011 compared with figures for the period 2004-2005

Source: UNODC estimates.

Épidémiologie

Fig. 49. Global population aged 15-64 and corresponding annual prevalence of cocaine use, 2011

Source: UNODC estimates (prevalence rates); United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (population).

Épidémiologie

Substances	Jeunes du secondaire - Québec	Canada		États-Unis		Europe	
	12 mois	À vie	12 mois	À vie	12 mois	À vie	12 mois
Alcool	59.7	92.8	79.3	82.5	66.4	-	-
Cannabis	27.2	44.5	14.1	41.9	11.5	21.8	6.8
Hallucinogènes	7.6	11.4	0.7	14.8	1.8	-	-
Cocaïne	3.4	10.6	1.9	14.7	1.8	3.6	1.2
Amphétamines	7.3	6.4	0.8	8.5	1.1	3.3	0.6
Ecstasy	-	4.1	1.1	6.3	1.0	2.8	0.8
Héroïne	0.9	0.9	-	1.6	0.2	- ^a	-

Québec: Enquête sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (2009)

Canada: Enquête sur les toxicomanies au Canada (2004)

États-Unis: *National Survey on Drug Use and Health* (NSDUH 2010)

Europe: *Annual Report on the State of the Drugs Problem* (2008)

Épidémiologie

- ▣ % d'utilisateurs qui deviennent dépendants (*National Comorbidity Survey*):
 - Nicotine 32%
 - Héroïne 23%
 - **Cocaïne 17%**
 - Alcool 15%
 - Stimulants (autre que cocaïne) 11%
 - Cannabis 9%
 - Anxiolytique, sédatif et hypnotique 9%
 - Hallucinogène 5%
 - Inhalant 4%
- ▣ 17.8% et 15.0% des femmes et des hommes exposés à la cocaïne développeront une dépendance (*National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions*)

Épidémiologie

- ▣ 0.4% de la population américaine a présenté un trouble lié à l'utilisation de la cocaïne dans la dernière année (1,119,000 personnes)
- ▣ 16.4% des demandes de traitement en toxicomanie sont liés à la cocaïne

Modes d'administration

Modes d'administration

Modes d'administration

Modes d'administration

Modes d'administration

Modes d'administration

Durée d'action IV et fumée: 15-30 minutes

Durée d'action IN: 1-3 heures

Modes d'administration

Modes d'administration

Common street names for cocaine

Cocaine base (smokable)	Base, black rock, crack, electric kool-aid, rock, gravel, purple caps, Scotty, scramble, superoake, twinkie, window pane, yam
Cocaine HCl	Aspirin, Big C, blow, coconut, oake, devil's dandruff, flake, Florida snow, foo-foo dust, happy dust, lady, nose candy, white dragon, white lady, yao
Cocaine paste	Basuco, bazooka, pasta
Cocaine in vagina	Balling
Cocaine + heroin	Belushi, bipping, blanco, boy-girl, dynamite, goof ball, he-she, murder one, sandwich, snowball, speedball
Cocaine + marijuana	51, banana, bazooka, blunt, C & M, candy sticks, caviar, champagne, cocktail, cocoa puff, crack bash, dirties, geek-joint, Greek, lace, P-dogs, premos, primo, Sherman stick, woo blunts, woolie
Cocaine + MDMA (ecstasy)	Bumping up
Cocaine + MDMA + LSD	Candy flipping on a string
Cocaine + methamphetamine	Croak, shabu
Cocaine + methcathinone	Wild cat
Cocaine + morphine	C & M
Cocaine + PCP	Beam me up Scottie, space ball, space base, space dust
Cocaine + tobacco	Cigamos, coolie, geek-joint
Cocaine + marijuana + PCP	Jim Jones, speed boat, squirrel, wickie
Cocaine + heroin + tobacco	Flamethrowers, primos
Cocaine + heroin + methamphetamine +flunitrazepam + alcohol	Five-way

Note that street names change over time and may differ by location. The same name may refer to more than one drug.

Effets de la cocaïne

Effets de la cocaïne

Effets de la cocaïne

- ▣ Adrénaline
- ▣ Noradrénaline
- ▣ Dopamine
- ▣ Acétylcholine
- ▣ Endorphines
- ▣ Enképhalines
- ▣ Sérotonine
- ▣ Acide gamma-aminobutyrique (GABA)
- ▣ Glutamate
- ▣ ...

Effets de la cocaïne

1. Liaison au transporteur de la dopamine
2. Inhibition de la recapture de la dopamine de la synapse
3. Augmentation des niveaux de dopamine

Effets de la cocaïne

Effets de la cocaïne

Effets de la cocaïne

↑vigilance

Confiance accrue

Euphorie

Humeur plus sociale / bavard

↑pouls/TA

Dilatation des pupilles

Hyperthermie

Nausées/vomissements

Arythmie ventriculaire

Anxiété extrême

Agitation

Hallucinations

Dépression respiratoire

Convulsions

Coma

Complications cardiaques

Décès

Sévérité de l'intoxication

Effets de la cocaïne

- A. Utilisation récente de cocaïne
- B. Changements comportementaux ou psychologiques inadaptés cliniquement significatifs (p.ex. : euphorie ou émoi affectif ; changement de la sociabilité ; hypervigilance ; sensibilité interpersonnelle ; anxiété, tension ou colère ; comportements stéréotypés ; altération du jugement ou altération du fonctionnement social ou professionnel) qui se sont développés pendant ou peu après l'utilisation de cocaïne
- C. Au moins deux des signes suivants se développant pendant ou peu après l'utilisation de cocaïne :
 1. tachycardie ou bradycardie
 2. dilatation pupillaire
 3. augmentation ou diminution de la tension artérielle
 4. transpiration ou frisson
 5. nausées ou vomissements
 6. perte de poids avérée
 7. agitation ou ralentissement psychomoteur
 8. faiblesse musculaire, dépression respiratoire, douleur thoracique ou arythmies cardiaques
 9. confusions, crises convulsives, dyskinésies, dystonies ou coma
- D. Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale, et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental

Effets de la cocaïne

A. Arrêt (ou réduction) d'une utilisation de cocaïne qui a été massive et prolongée

B. **Humeur dysphorique** avec au moins deux des changements physiologiques suivants qui se développent de quelques heures à quelques jours après le critère A :

1. **fatigue**
2. **rêves intenses et déplaisants**
3. **insomnie ou hypersomnie**
4. **augmentation de l'appétit**
5. **agitation ou ralentissement psychomoteur**

C. Les symptômes du critère B causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres domaines importants

D. Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale et ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental.

Le classique *crash* dans les premiers jours: symptômes dépressifs, hypersomnie, idées suicidaires possibles

La cocaïne se lie aux récepteurs dans le striatum pour une courte durée

Le fonctionnement cérébral (striatal, frontal et limbique) demeure altéré plus de 3 mois après la dernière utilisation de cocaïne

Your Brain After Drugs

Photo courtesy of Nora Volkow, Ph.D., Volkow ND, Hitzemann R, Wang G-J, Fowler JS, Wolf AP, Dewey SL. Long-term frontal brain metabolic changes in cocaine abusers. *Synapse* 11:184-190, 1992. Volkow ND, Fowler JS, Wang G-J, Hitzemann R, Logan J, Schlyer D, Dewey S, Wolf AP. Decreased dopamine D2 receptor availability is associated with reduced frontal metabolism in cocaine abusers. *Synapse* 14:169-177, 1995.

Effets de la cocaïne

- ▣ Psychiatrique: dépression, anxiété, psychose
- ▣ Neurologique: AVC, infections SNC, troubles cognitifs
- ▣ Cardiaque: risque accru d'incident ischémique, endocardite
- ▣ ORL: anomalie septum nasal, irritation voie respiratoire, lésions bouche/lèvres, usure anormale de la dentition
- ▣ Infectieux: infections transmissibles par le sang

Craving et binge

Cortex préfrontal
Motivation, activités dirigées vers un but, prise de décision, jugement, valeur de la récompense

Striatum
Intégration de l'information cognitive et motrice, récompense, motivation

Système limbique
Émotion, motivation, mémoire émotionnelle et comportements sociaux

Craving et binge

Striatum (Nucleus Accumbens)

Intégration de l'information cognitive et motrice, récompense, motivation

Individu normal

Transition vers la toxicomanie: génétique, effet des drogues, exposition prénatale

Individu dépendant

Craving et binge

Craving et binge

Craving et binge

Phase *binge/intoxication*

Craving et binge

- ▣ Binge: épisode de quelques heures à quelques jours avec consommation d'intensité élevée
- ▣ Associé à perte de contrôle, un usage compulsif de la substance
- ▣ Souvent suivi d'une période de « crash » qui correspond parfois à un épisode de sevrage
- ▣ Associé à certains problèmes et prise de risque

Craving et binge

Craving et binge

Phase sevrage/affects négatifs

Craving et binge

Phase anticipation/*craving*

Craving et binge

- ▣ Craving: *désir intense ou une urgence à consommer une substance*
- ▣ Conscient ou inconscient
- ▣ Peut être induit par la substance, des stimuli associés et le stress
- ▣ 45% des individus avec trouble lié à l'utilisation de la cocaïne rapporte avoir du craving
- ▣ Associé à une évolution défavorable du trouble lié à l'utilisation de la cocaïne

Craving et binge

Craving et binge

Craving et binge

Craving et binge

Objectifs

1. **Connaître les principales données épidémiologiques sur la consommation de cocaïne**
2. **Connaître les principaux modes de consommation de la cocaïne**
3. **Comprendre les principaux effets de la cocaïne, tant du point de vue neurobiologique que clinique**
4. **Se familiariser avec les notions de « craving » et de « binge »**

LA COCAÏNE ET SES MULTIPLES FACETTES

**COCAÏNE, SANTÉ MENTALE ET PRISE DE RISQUE : PORTRAIT DE
SITUATION ET PISTES POUR L'INTERVENTION**

Formation croisée à partir des résultats du projet COSMO

9 Avril 2014

**Didier Jutras-Aswad MD, MSc, FRCPC
Professeur adjoint de clinique, Université de Montréal
Directeur, Unité de Psychiatrie des Toxicomanies du CHUM
Chercheur, CRCHUM**